Educazione Sanitaria

MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN ETÀ PEDIATRICA

SECONDO LINEE GUIDA INTERNAZIONALI ILCOR

OSTRUZIONE PARZIALE LATTANTE 0-1 ANNO



IL LATTANTE **PIANGE, RESPIRA CON DIFFICOLTÀ, TOSSISCE.**

NON EFFETTUARE NESSUNA MANOVRA, MA FAVORIRE LA TOSSE IN POSIZIONE DECLIVE

OSTRUZIONE COMPLETA LATTANTE 0-1 ANNO

IL LATTANTE **NON RESPIRA,** NON TOSSISCE, È CIANOTICO E COSCIENTE.

CHIAMARE SUBITO IL **112/118**





EFFETTUARE **5 COMPRESSIONI** AL CENTRO DELLO STERNO



EFFETTUARE **5 PACCHE** INTERSCAPOLARI

ALTERNARE LE MANOVRE **FINO ALLA DISOSTRUZIONE O ALLA PERDITA DI COSCIENZA DEL LATTANTE**

IN CASO DI PERDITA DI COSCIENZA, **INIZIARE RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE**

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

POSIZIONARE IL LATTANTE SU UN PIANO RIGIDO ED EFFETTUARE **30 COMPRESSIONI TORACICE**



POSIZIONE NEUTRA DELLA TESTA ED EFFETTUARE **2 VENTILAZIONI** BOCCA-BOCCA/NASO

